



BASE DE DONNÉES PUBLIQUE DES MÉDICAMENTS

Visiter [medicaments.gouv.fr] 

Accueil | Glossaire | Aide

Dernière mise à jour le 28/10/2024

Fiche info

Résumé des caractéristiques du produit

Notice

SOMMAIRE

Description médicament
Informations
Utilisation
Effets indésirables
Conservation
Info. supplémentaires

POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade - Notice patient 

ANSM - Mis à jour le : 29/12/2023

Dénomination du médicament

POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade
Acide salicylique

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade ?
3. Comment utiliser POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Verrucides et coricides (Dermatologie) - code ATC : D11AF

Ce médicament est préconisé dans le traitement local d'appoint des cors, durillons, œil-de-perdrix et verrues.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade ?

N'utilisez jamais POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade :

- Si vous êtes allergique à la substance active (acide salicylique) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6
- En cas de cors infectés

Avertissements et précautions

Faites attention avec POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade :

En cas d'artérite (mauvaise circulation sanguine), de diabète ou de neuropathie (perte de sensibilité des mains ou des pieds), consulter votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

Ce produit est caustique. Ne pas déborder sur la peau saine au-delà de la zone à traiter.

Arrêter l'application en cas de survenue de douleurs, irritation ou infection.

En raison du risque de passage de la substance active dans le sang, ce produit ne doit pas être appliqué sur une grande surface, notamment les verrues couvrant une surface de plus de 5 cm² (approximativement la taille d'un timbre-poste).

En cas d'échec du traitement bien conduit ou en cas de récidence, consulter votre médecin. Il peut être utile de rechercher la cause et de la traiter en conséquence (mesures orthopédiques de correction de l'appui, modification du chaussage).

Ne pas utiliser sur une plaie ouverte, une peau irritée ou rouge, ou sur une zone infectée.

Ne pas utiliser sur les grains de beauté, les taches de naissance, les verrues des organes génitaux, du visage ou des muqueuses, ou les verrues sur lesquelles des poils poussent, ayant des bords rouges ou une couleur inhabituelle.

Adressez-vous à votre médecin ou, pharmacien avant d'utiliser POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade.

Enfants

Chez l'enfant de moins de 4 ans, l'utilisation de la pommade M.O. COCHON ne pourra se faire qu'après avis médical.

L'utilisation chez les enfants doit être réalisée sous la supervision d'un adulte.

Autres médicaments et POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade avec des aliments, des boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade contient

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade ? ↗

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Réservé à l'usage cutané.

Fréquence d'application : 1 fois par jour, de préférence le soir au coucher.

La durée de traitement est généralement en cas de cor, durillons, œil-de-perdrix, de 5 à 6 jours sans dépasser 2 semaines de traitement.

Dans le cas des verrues, une amélioration est cliniquement visible après 1 à 2 semaines de traitement, mais l'effet maximum est attendu au bout de 4 à 6 semaines de traitement. Il est recommandé de continuer le traitement jusqu'à ce que la verrue ait complètement disparu sans dépasser 6 semaines de traitement.

Si la verrue persiste au-delà de 6 semaines de traitement, il est conseillé aux patients de consulter un médecin.

Les patients doivent consulter un médecin ou un pharmacien en cas d'irritation de la peau.

Mode et voie d'administration

Chaque soir, après un bain chaud, enduire avec soin la lésion sans déborder sur la peau saine.

- Savonner, rincer et sécher soigneusement la zone à traiter à l'aide d'un linge propre. En cas de verrue rebelle, faire tremper la verrue dans l'eau chaude pendant 5 minutes.
- Frotter la surface de la zone à traiter avec une lime à ongles à usage unique (en carton), en évitant de faire saigner. Si un saignement se produit, arrêter le traitement pendant quelques jours.
- Il est conseillé de protéger préalablement la peau saine en appliquant un vernis neutre incolore.
- Appliquer une fine couche de pommade sur la zone à traiter à l'aide d'un coton-tige sans déborder sur la peau saine.
- Couvrir d'un pansement la nuit. Le matin, retirer le pansement, savonner, rincer et sécher la zone à traiter. Puis se laver les mains.

Si vous avez utilisé plus de POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade que vous n'auriez dû

Risque de brûlure en cas de surdosage.

Si vous oubliez d'utiliser POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ↗

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Irritation de la peau en cas d'application sur la peau saine,
- Risque de phénomène d'irritation locale et de sensation de brûlure.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site Internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade ? ↗

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS ↗

Ce que contient POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade ↗

- La substance active est :

Acide salicylique..... 50 g

Pour 100 g de pommade.

- L'autre composant est : suif de bœuf

Qu'est-ce que POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade et contenu de l'emballage extérieur ↗

Ce médicament se présente sous forme de pommade.

Pot de 10 g.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ↗

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

PLACE LUCIEN AUVERT

77020 MELUN CEDEX

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché ↗

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

PLACE LUCIEN AUVERT

77020 MELUN CEDEX

Fabricant ↗

LABORATOIRE MOC

176, RUE DE L'ARBRISSEAU

59000 LILLE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen ↗

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : ↗

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres ↗

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

[Retour en haut de la page](#) ↗

